

НМУ, 2 курс, дифференциальная геометрия. Листок 3.
Поверхности в n -мерном евклидовом
пространстве. 25.02.2013.

Для получения зачёта в каждом из листков необходимо решить не менее трёх задач.

Задача 1. Рассмотрим гиперповерхность в \mathbb{E}^n . В качестве базиса нормального пространства будем брать единичный нормальный вектор $\eta_1 = \mathbf{m}$. Найти связность в нормальном расслоении.

Задача 2. Докажите формулу

$$\langle \nabla_X Y, Z \rangle = \frac{1}{2} (\partial_X \langle Y, Z \rangle + \partial_Y \langle Z, X \rangle - \partial_Z \langle X, Y \rangle + \langle Z, [X, Y] \rangle + \langle Y, [Z, X] \rangle - \langle X, [Y, Z] \rangle),$$

не используя координат векторных полей и символов Кристоффеля.

Задача 3. Вывести соотношение между db , b , Γ и K (уравнение Петерсона-Кодацци) по аналогии с уравнением Гаусса $d\Gamma + \Gamma \wedge \Gamma = b_\mu \wedge b^\mu$, связывающим $d\Gamma$, Γ и b . Доказать, что в случае гиперповерхности если взять единичное поле нормалей в качестве базиса в нормальных векторных полях, то уравнение Петерсона-Кодацци не содержит K . Записать уравнение Петерсона-Кодацци в терминах Γ_{ij}^l , b_{ij}^μ , $K_{i,\nu}^\mu$ в частном случае двумерной поверхности в \mathbb{E}^3 .

Задача 4. Придумать аналог нормали средней кривизны для k -поверхности в \mathbb{E}^n . Естественно, при $k = 2$, $n = 3$ результат должен совпадать с классическим определением (и это надо проверить). *Указание: используйте линейный функционал $\xi \mapsto \text{tr } W_\xi$ на пространстве N_{AM} .*

Задача 5. Рассмотрим кривую в \mathbb{E}^n . Легко видеть, что любое базисное касательное векторное поле e_1 можно рассматривать как вектор скорости для некоторой параметризации. Пусть t такой параметр. Доказать, что $\Gamma_{11}^1 = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \ln g_{11}$, а кривизна кривой может быть найдена по формуле

$$k = \sqrt{\left(\frac{b_{11}^1}{g_{11}}\right)^2 + \dots + \left(\frac{b_{11}^{n-1}}{g_{11}}\right)^2}.$$

Задача 6*. Доказать первое структурное уравнение Картана

$$de^\alpha = e^\beta \wedge \Gamma_{\beta}^\alpha,$$

где e^α — базис, дуальный к выбранному базису e_α пространства касательных векторных полей.