

Метрические пространства и непрерывные отображения

Метрикой (функцией расстояния) на множестве X называется функция $\rho : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$, удовлетворяющая трем свойствам:

- (1) $\rho(x, y) = \rho(y, x) \geq 0$ для всех $x, y \in X$;
- (2) равенство $\rho(x, y) = 0$ достигается, если и только, если $x = y$;
- (3) выполнено неравенство треугольника $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$.

Число $\rho(x, y)$ называется расстоянием между точками x и y .

1. Пространство \mathbb{R}^n по определению состоит из упорядоченных наборов n действительных чисел $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$.

(а) Проверьте, что функция $\rho_1(x, y) = \max_{1 \leq i \leq n} (|x_i - y_i|)$ является метрикой в \mathbb{R}^n . Как выглядят шары в этой метрике?

(б) Проверьте, что функция $\rho_2(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$ также является метрикой в \mathbb{R}^n .

(в) Докажите полноту метрических пространств (\mathbb{R}^n, ρ_1) и (\mathbb{R}^n, ρ_2) . Докажите, что множество в (\mathbb{R}^n, ρ_1) или (\mathbb{R}^n, ρ_2) компактно тогда и только тогда, когда оно замкнуто и ограничено.

2. Верно ли, что для любой метрики ρ функция

$$\tilde{\rho}(x, y) = \frac{\rho(x, y)}{1 + \rho(x, y)}$$

снова является метрикой?

3. Докажите, что непрерывная функция $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ на метрическом компакте (X, ρ) достигает своего максимального и минимального значений.

4. В метрическом пространстве шар большего радиуса может строго содержаться в шаре меньшего радиуса. Приведите пример.

5*. Приведите пример полного метрического пространства и последовательности вложенных замкнутых шаров в этом пространстве, пересечение которых пусто. (Заметим, что, если радиусы шаров стремятся к нулю, то такая последовательность вложенных шаров обязана иметь общую точку.)

Отображение $f : X \rightarrow X$ называется сжимающим, если существует такое число $0 < q < 1$, что для любых $x, y \in X$ выполнено

$$\rho(f(x), f(y)) \leq q\rho(x, y).$$

6. Докажите, что сжимающее отображение полного метрического пространства непрерывно и имеет ровно одну неподвижную точку.

7. Приведите пример отображения $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ без неподвижных точек, такого, что $|f(x) - f(y)| < |x - y|$ для любых $x \neq y$.

8. Докажите, что, если какая-то итерация f^{on} отображения f полного пространства X в себя является сжимающей, то f имеет неподвижную точку. Может ли при этих условиях отображение f иметь несколько неподвижных точек.

9. Пусть X – компактное метрическое пространство, а $F : X \rightarrow X$ – отображение, такое, что $\rho(F(x), F(y)) < \rho(x, y)$ для любой пары различных точек $x, y \in X$. Докажите, что F имеет единственную неподвижную точку.

10*. Пусть $1 < \lambda < 3$ и $f(x) = \lambda x(1 - x)$. Докажите, что для всякой точки $x \in (0, 1)$ последовательность $f^{on}(x)$ сходится к неподвижной точке отображения f .